ARACHNIDES NOUVEAUX
D'ALGÉRIE

Par Eugène SIMON

Genre SCOTOLATHYS nov. gen.

Céphalothorax peu élevé ; partie céphalique peu ou point convexe. — Yeux 6, assez gros : 4 antérieurs connivents, les médians plus gros et 2 postérieurs plus petits touchant aux latéraux antérieurs. Bandeau plus étroit que les yeux antérieurs. Pièce labiale un peu plus longue que large, fortement acuminée, obtuse. Lames et plastron comme chez *Lathys*. — Pattes 4, 1, 2, 3 courtes, mutiques, pourvues de longs crins ; calamistrum formé de crins très longs, recourbés comme chez *Œcobius*.

Voisin du genre *Lathys* (1) *(Lethia* auctores), s'en distingue à première vue par le nombre des yeux qui est de six et par le calamistrum formé de crins très longs.

SCOTOLATHYS SIMPLEX sp. nov.
♀ Long. 2^{mm}.

Cephalothorax sat convexus, fulvo testaceus nitidus. Oculi fere æqui, albo-micantes, intus nigro marginati. Abdomen oblongum antice posticeque rotundatum parce pilosum, albo testaceum, lineis transversis arcuatis obscurioribus vix distinctis in parte secunda ornatum. Partes oris, sternum, pedesque fulvo testacea sat longe et parce nigro pilosa.

Oran, au Camp-des-Planteurs, dans les mousses, sous les pins.

Genre ALTELLA E. Sim.
Amphissa Cambr., Ann. mag. nat. hist., 1882.

Le nom de *Amphissa* étant préoccupé (Adams., Moll., 1858) nous proposons de le remplacer par celui de *Altella* (nom propre latin).

(1) Nom nouveau pour le genre *Lethia* Menge, nom préoccupé (Hübner, Lépid., 1816).

ARACHNIDES NOUVEAUX
D'ALGÉRIE

Par Eugène SIMON

Genre SCOTOLATHYS nov. gen.

Céphalothorax peu élevé ; partie céphalique peu ou point convexe. — Yeux 6, assez gros : 4 antérieurs connivents, les médians plus gros et 2 postérieurs plus petits touchant aux latéraux antérieurs. Bandeau plus étroit que les yeux antérieurs. Pièce labiale un peu plus longue que large, fortement acuminée, obtuse. Lames et plastron comme chez *Lathys*. — Pattes 4, 1, 2, 3 courtes, mutiques, pourvues de longs crins ; calamistrum formé de crins très longs, recourbés comme chez *Œcobius*.

Voisin du genre *Lathys* (1) *(Lethia* auctores), s'en distingue à première vue par le nombre des yeux qui est de six et par le calamistrum formé de crins très longs.

SCOTOLATHYS SIMPLEX sp. nov.
♀ Long. 2^{mm}.

Cephalothorax sat convexus, fulvo testaceus nitidus. Oculi fere æqui, albo-micantes, intus nigro marginati. Abdomen oblongum antice posticeque rotundatum parce pilosum, albo testaceum, lineis transversis arcuatis obscurioribus vix distinctis in parte secunda ornatum. Partes oris, sternum, pedesque fulvo testacea sat longe et parce nigro pilosa.

Oran, au Camp-des-Planteurs, dans les mousses, sous les pins.

Genre ALTELLA E. Sim.
Amphissa Cambr., Ann. mag. nat. hist., 1882.

Le nom de *Amphissa* étant préoccupé (Adams., Moll., 1858) nous proposons de le remplacer par celui de *Altella* (nom propre latin).

(1) Nom nouveau pour le genre *Lethia* Menge, nom préoccupé (Hübner, Lépid., 1816).

ALTELLA UNCATA sp. nov.
♂ Long. 1mm9.

Cephalothorax oblongus, humilis, nitidus, in medio lævis utrinque subtile coriaceus, fuscus in medio sensim dilutior. Oculi postici ovati, fere æqui, in linea recta dispositi, medii inter se latius quam a lateralibus remoti. Oculi antici conferti, medii minores. Abdomen breve ovatum, fulvo testaceum, parce et breve cinereo pubescens. Sternum fusco rufescens, nitidum, subtile coriaceum. Pedes breves testacei, femoribus, præsertim I et II infuscatis, metatarso I infra breve et robuste biaculeato, tibia III aculeo longissimo arcuato et acutissimo infra pone medium instructa, articulis reliquis cunctis muticis. Pedes-maxillares fusci, trochantero patellaque dilutioribus atque fulvis, patella crassa convexa, tibia paulo breviore et angustiore extus ad apicem apophysa simplice et obtusa, antice directa atque articulo paulo breviore instructa, tarso ovato sat magno, bulbo simplice fulvo, disciformi, stylo nigro crasso circumdato.

♀ Long. 2mm5.

Cephalothorax omnino lævis, obscure fulvo olivaceus, magis convexus, parte cephalica latiore et obtusa. Oculi postici æqui minimi inter se latius disjuncti, spatio inter laterales et medios diametro oculi paulo latiori. Sternum nitidum haud coriaceum. Pedes testacei, femoribus vix infuscatis, tibiis I et II infra spinis gracilibus 2-2, tibia III infra spina gracili arcuata unica armatis. Abdomen toto testaceum. Plaga vulvæ magna, rufula, paulo coriacea et pilosa utrinque parum distincte impressa.

Alger, Gorges de la Chiffa.
Isolément sous les pierres dans les endroits secs.

ALTELLA RUPICOLA sp. nov.
♀ Long. 2mm5.

Præcedenti valde affinis differt cephalothorace antice latiore obscure fulvo olivaceo, parte thoracica vittis fuscis divaricatis parum distinctis notata, oculis mediis posticis lateralibus paulo minoribus et a lateralibus minus late remotis (spatio diametrum oculi vix æquante), abdomine fusco testaceo, cinereo piloso, an-

ALTELLA UNCATA sp. nov.
♂ Long. 1mm9.

Cephalothorax oblongus, humilis, nitidus, in medio lævis utrinque subtile coriaceus, fuscus in medio sensim dilutior. Oculi postici ovati, fere æqui, in linea recta dispositi, medii inter se latius quam a lateralibus remoti. Oculi antici conferti, medii minores. Abdomen breve ovatum, fulvo testaceum, parce et breve cinereo pubescens. Sternum fusco rufescens, nitidum, subtile coriaceum. Pedes breves testacei, femoribus, præsertim I et II infuscatis, metatarso I infra breve et robuste biaculeato, tibia III aculeo longissimo arcuato et acutissimo infra pone medium instructa, articulis reliquis cunctis muticis. Pedes-maxillares fusci, trochantero patellaque dilutioribus atque fulvis, patella crassa convexa, tibia paulo breviore et angustiore extus ad apicem apophysa simplice et obtusa, antice directa atque articulo paulo breviore instructa, tarso ovato sat magno, bulbo simplice fulvo, disciformi, stylo nigro crasso circumdato.

♀ Long. 2mm5.

Cephalothorax omnino lævis, obscure fulvo olivaceus, magis convexus, parte cephalica latiore et obtusa. Oculi postici æqui minimi inter se latius disjuncti, spatio inter laterales et medios diametro oculi paulo latiori. Sternum nitidum haud coriaceum. Pedes testacei, femoribus vix infuscatis, tibiis I et II infra spinis gracilibus 2-2, tibia III infra spina gracili arcuata unica armatis. Abdomen toto testaceum. Plaga vulvæ magna, rufula, paulo coriacea et pilosa utrinque parum distincte impressa.

Alger, Gorges de la Chiffa.
Isolément sous les pierres dans les endroits secs.

ALTELLA RUPICOLA sp. nov.
♀ Long. 2mm5.

Præcedenti valde affinis differt cephalothorace antice latiore obscure fulvo olivaceo, parte thoracica vittis fuscis divaricatis parum distinctis notata, oculis mediis posticis lateralibus paulo minoribus et a lateralibus minus late remotis (spatio diametrum oculi vix æquante), abdomine fusco testaceo, cinereo piloso, an-

tice minute et irregulariter fusco variegato, postice lineis fulvis exillimis transversis et valde arcuatis ornato.

Orléansville, Bou-Saada, Djebel-Antar, près Mécheria.

Sous les pierres sur les pentes très sèches.

Ces deux espèces sont voisines de *A.* (*Amphissa*) *spinigera* Cambr., d'Angleterre, elles en diffèrent principalement par la coloration de l'abdomen. — Les différences sexuelles sont assez grandes dans ce genre, chez la femelle le céphalothorax est beaucoup plus convexe et plus large en avant, la grande épine courbe du tibia de la troisième paire, si caractéristique chez le mâle, est remplacée par une épine fine et assez courte.

Genre DEVADE E. Sim.

Diotima E. Sim., Ann. Soc. ent. Fr., 1880, p. LIV.

Le nom de *Diotima* étant préoccupé (Pascoe, Coléop., 1860), nous proposons pour le remplacer celui de *Devade* (nom géographique).

DEVADE HIRSUTISSIMA E. Sim., *l. c.*

Cette espèce que nous avons découverte aux environs de Toulon, au bord de la mer, habite la région des chotts en Algérie et en Tunisie ; elle est propre aux terrains salés.

Genre CHÆREA nov. gen. (1).

Céphalothorax bas ; partie céphalique à peine convexe. Yeux antérieurs en ligne droite, les médians un peu plus petits et plus séparés. Yeux postérieurs en ligne droite, petits, égaux ; les médians beaucoup plus séparés (intervalle plus de trois fois plus large que le diamètre) ; médians en trapèze beaucoup plus large que long et plus étroit en avant ; latéraux subconnivents. Bandeau à peine plus large que les yeux antérieurs. Chélicères convexes à la base, atténuées, un peu divergentes ; bord supérieur pourvu de 3 dents dont la médiane plus forte ; bord inférieur de 2 dents égales ; crochet long. — Pièces buccales, plastron et pattes comme chez *Dictyna*, seulement les tibias III et IV pourvus en dessous de 1 ou 2 épines terminales.

(1) Nom propre, latin masc.

tice minute et irregulariter fusco variegato, postice lineis fulvis exillimis transversis et valde arcuatis ornato.

Orléansville, Bou-Saada, Djebel-Antar, près Mécheria.

Sous les pierres sur les pentes très sèches.

Ces deux espèces sont voisines de *A.* (*Amphissa*) *spinigera* Cambr., d'Angleterre, elles en diffèrent principalement par la coloration de l'abdomen. — Les différences sexuelles sont assez grandes dans ce genre, chez la femelle le céphalothorax est beaucoup plus convexe et plus large en avant, la grande épine courbe du tibia de la troisième paire, si caractéristique chez le mâle, est remplacée par une épine fine et assez courte.

Genre DEVADE E. Sim.

Diotima E. Sim., Ann. Soc. ent. Fr., 1880, p. LIV.

Le nom de *Diotima* étant préoccupé (Pascoe, Coléop., 1860), nous proposons pour le remplacer celui de *Devade* (nom géographique).

DEVADE HIRSUTISSIMA E. Sim., *l. c.*

Cette espèce que nous avons découverte aux environs de Toulon, au bord de la mer, habite la région des chotts en Algérie et en Tunisie ; elle est propre aux terrains salés.

Genre CHÆREA nov. gen. (1).

Céphalothorax bas ; partie céphalique à peine convexe. Yeux antérieurs en ligne droite, les médians un peu plus petits et plus séparés. Yeux postérieurs en ligne droite, petits, égaux ; les médians beaucoup plus séparés (intervalle plus de trois fois plus large que le diamètre) ; médians en trapèze beaucoup plus large que long et plus étroit en avant ; latéraux subconnivents. Bandeau à peine plus large que les yeux antérieurs. Chélicères convexes à la base, atténuées, un peu divergentes ; bord supérieur pourvu de 3 dents dont la médiane plus forte ; bord inférieur de 2 dents égales ; crochet long. — Pièces buccales, plastron et pattes comme chez *Dictyna*, seulement les tibias III et IV pourvus en dessous de 1 ou 2 épines terminales.

(1) Nom propre, latin masc.

Voisin du genre *Dictyna,* dont il diffère surtout par la partie céphalique moins convexe; les yeux médians postérieurs beaucoup plus séparés l'un de l'autre que des latéraux, enfin par le groupe des médians beaucoup plus large que long.

CHÆREA MARITIMUS sp. nov.

♂ Long. 3^{mm}.

Cephalothorax obscure fulvo rufescens, lævis, nitidus. Abdomen oblongo elongatum, albido testaceum cinereo pubescens. Chelæ longæ et robustæ, ad basin convexæ apicem versus parum attenuatæ et paulo divaricatæ, fusco rufescentes, sat dense coriaceæ et parce nigro granulosæ. Sternum fulvum, læve, parce et subtile punctatum. Pedes fulvi, sat longe cinereo pilosi, tibiis III et IV infra ad apicem unispinosis. Pedes-maxillares fulvi, femore tarsoque paulo infuscatis; patella longiore quam latiore convexa paulo oblonga, tibia patella haud breviore et multo angustiore, mutica extus ad apicem margine paulo dilatato et lamelloso, tarso sat minimo ovato acuminato, bulbo fulvo stylo nigro marginato, antice disciformi, postice in apophysa lamellosa et truncata breve producto.

♀ Long. 3^{mm}5.

Chelæ robustiores, coriaceæ atque parcissime nigro granulosæ. Abdomen latius, omnino albido testaceum. Pedes-maxillares pedesque fulvo rufescentes.

Nous avons découvert cette espèce à Nemours (département d'Oran), où elle vit sur la plage sous les touffes de plantes; nous l'avons retrouvée dans les mêmes conditions à la Mare-Menor, près Carthagène.

Genre XESTASPIS nov. gen.

Bandeau aussi large que les yeux antérieurs ou plus étroit. Hanches postérieures assez allongées, cylindriques, disjointes, mais leur intervalle plus étroit que leur longueur. Toutes les pattes mutiques. Téguments du céphalothorax rugueux, ceux du plastron et des scutum abdominaux lisses et pronfondément ponctués.

Voisin du genre *Dictyna,* dont il diffère surtout par la partie céphalique moins convexe; les yeux médians postérieurs beaucoup plus séparés l'un de l'autre que des latéraux, enfin par le groupe des médians beaucoup plus large que long.

CHÆREA MARITIMUS sp. nov.

♂ Long. 3^{mm}.

Cephalothorax obscure fulvo rufescens, lævis, nitidus. Abdomen oblongo elongatum, albido testaceum cinereo pubescens. Chelæ longæ et robustæ, ad basin convexæ apicem versus parum attenuatæ et paulo divaricatæ, fusco rufescentes, sat dense coriaceæ et parce nigro granulosæ. Sternum fulvum, læve, parce et subtile punctatum. Pedes fulvi, sat longe cinereo pilosi, tibiis III et IV infra ad apicem unispinosis. Pedes-maxillares fulvi, femore tarsoque paulo infuscatis; patella longiore quam latiore convexa paulo oblonga, tibia patella haud breviore et multo angustiore, mutica extus ad apicem margine paulo dilatato et lamelloso, tarso sat minimo ovato acuminato, bulbo fulvo stylo nigro marginato, antice disciformi, postice in apophysa lamellosa et truncata breve producto.

♀ Long. 3^{mm}5.

Chelæ robustiores, coriaceæ atque parcissime nigro granulosæ. Abdomen latius, omnino albido testaceum. Pedes-maxillares pedesque fulvo rufescentes.

Nous avons découvert cette espèce à Nemours (département d'Oran), où elle vit sur la plage sous les touffes de plantes; nous l'avons retrouvée dans les mêmes conditions à la Mare-Menor, près Carthagène.

Genre XESTASPIS nov. gen.

Bandeau aussi large que les yeux antérieurs ou plus étroit. Hanches postérieures assez allongées, cylindriques, disjointes, mais leur intervalle plus étroit que leur longueur. Toutes les pattes mutiques. Téguments du céphalothorax rugueux, ceux du plastron et des scutum abdominaux lisses et pronfondément ponctués.

Très voisin du genre *Gamasomorpha* Karsch, s'en distingue principalement par le bandeau plus étroit que les yeux antérieurs, tandis qu'il est plus large chez *Gamasomorpha*, par les hanches postérieures allongées et cylindriques, tandis quelles sont globuleuses chez *Gamasomorpha*, enfin par les pattes entièrement mutiques, tandis que chez *Gamasomorpha* les tibias et métatarses antérieurs sont pourvus en dessous de deux séries de grandes épines.

Le type de ce genre est *X. (Oonops) loricata* L. Koch, des îles Viti (Ar. Austr., p. 448).

Une seconde espèce habite l'Algérie.

XESTASPIS NITIDA sp. nov.
♀ Long. $2^{mm}8$.

Cephalothorax rufescens, ovatus antice attenuatus, postice convexus, sat valde et regulariter granulosus. Oculi 4 postici conferti lineam rectam dispositi, medii lateralibus majores late ovati recti. Oculi antici posticis majores, rotundati, a sese parum disjuncti. Clypeus diametro oculorum anticorum angustior. Abdomen ovatum valde depressum, scuto duriusculo rufescente nitido sat valde et dense punctato-impresso et parce setuloso supra omnino obtectum. Sternum fusco carmineum nitidissimum haud rugosum, parcissime punctatum. Scutum abdominale ventrale nitidum parve punctatum. Pedes-maxillares pedesque luridi, coxis, præsertim posticis infuscatis et rufescentibus, sat longe pilosi.

Bou-Saada.

LEPTONETA SPINIMANA sp. nov.
♂ ♀ Long. $1^{mm}5$.

Cephalothorax albo testaceus subpellucens, margine antico paulo infuscatus, nitidissimus haud coriaceus, sat convexus. Clypeus area oculorum vix angustior, antice directus, fere planus, antice recte truncatus cum angulis rotundatis. Oculi 4 antici æqui, lineam recurvam formantes, inter se contingentes (medii a sese angustissime disjuncti). Oculi postici minutissimi contigui ab anticis longe remoti. Abdomen globosum albo opacum. Pedes longissimi, albo testacei subpellucentes, mutici, breve et parce pilosi, femoribus anticis haud incrassatis.

Très voisin du genre *Gamasomorpha* Karsch, s'en distingue principalement par le bandeau plus étroit que les yeux antérieurs, tandis qu'il est plus large chez *Gamasomorpha*, par les hanches postérieures allongées et cylindriques, tandis quelles sont globuleuses chez *Gamasomorpha*, enfin par les pattes entièrement mutiques, tandis que chez *Gamasomorpha* les tibias et métatarses antérieurs sont pourvus en dessous de deux séries de grandes épines.

Le type de ce genre est *X. (Oonops) loricata* L. Koch, des îles Viti (Ar. Austr., p. 448).

Une seconde espèce habite l'Algérie.

XESTASPIS NITIDA sp. nov.
♀ Long. $2^{mm}8$.

Cephalothorax rufescens, ovatus antice attenuatus, postice convexus, sat valde et regulariter granulosus. Oculi 4 postici conferti lineam rectam dispositi, medii lateralibus majores late ovati recti. Oculi antici posticis majores, rotundati, a sese parum disjuncti. Clypeus diametro oculorum anticorum angustior. Abdomen ovatum valde depressum, scuto duriusculo rufescente nitido sat valde et dense punctato-impresso et parce setuloso supra omnino obtectum. Sternum fusco carmineum nitidissimum haud rugosum, parcissime punctatum. Scutum abdominale ventrale nitidum parve punctatum. Pedes-maxillares pedesque luridi, coxis, præsertim posticis infuscatis et rufescentibus, sat longe pilosi.

Bou-Saada.

LEPTONETA SPINIMANA sp. nov.
♂ ♀ Long. $1^{mm}5$.

Cephalothorax albo testaceus subpellucens, margine antico paulo infuscatus, nitidissimus haud coriaceus, sat convexus. Clypeus area oculorum vix angustior, antice directus, fere planus, antice recte truncatus cum angulis rotundatis. Oculi 4 antici æqui, lineam recurvam formantes, inter se contingentes (medii a sese angustissime disjuncti). Oculi postici minutissimi contigui ab anticis longe remoti. Abdomen globosum albo opacum. Pedes longissimi, albo testacei subpellucentes, mutici, breve et parce pilosi, femoribus anticis haud incrassatis.

♂. Pedes-maxillares albo testacei, femore longo, gracili, vix arcuato, spinis longis nigris 8 seriem unicam formantibus infra instructo, patella gracili, fere duplo longiore quam latiore, haud convexa, tibia patella multo longiore, cylindrico recto, utrinque pilis nigris longis parce munita, tarso tibia fere longitudine æqua, angusto, paulo attenuato, haud convexo nec depresso, apice simplice pilis nigris erectis producto, bulbo globoso nitidissimo, laminis membranaceis binis minutis breve producto.

Algérie : Ravin de l'Oued-el-Kebir, près Blidah.

Nous avons trouvé cette espèce au mois de mai sous de très grosses pierres au bord du torrent.

Elle est remarquable par la série de longues épines dont le fémur de la patte-mâchoire est armé chez le mâle.

SELAMIA HISTRIONICA sp. nov.

♀ Long. 5 à 5^{mm}5.

Cephalothorax oblongus, convexus, nitidus, obscure fusco olivaceus, linea media dilutiore parum expressa notatus. Oculi fere ut in *S. reticulata* sed medii antici minores. Clypeus multo latior, area oculorum haud angustior, verticalis planus. — Abdomen late ovatum, convexum, supra nigro violaceum late testaceo variatum, maculis magnis valde irregularibus et digitatis biseriatim dispositis decoratum, infra cinereo testaceum haud vittatum. Mamillæ albo testaceæ. Sternum fusco rufescens nitidum. — Pedes sat longi et robusti obscure fulvo olivacei, patellis metatarsis tarsisque dilutioribus, tibia I et metatarsis I et II muticis, tibia II spinis duabus gracilibus et setiformibus infra instructa; pedes postici valde aculeati, tarsis gracilibus et longis utrinque 2 vel 3 breve aculeatis. Vulva fovea magna paulo latiore quam longiore, anguste marginata atque plagam magnam rufam obtuse cordiformem includente.

♂ Long. 4^{mm}3.

Pedes longiores fulvi, femoribus infuscatis. Pedes-maxillares fulvo olivacei, tibia tarsoque rufescentibus, femore fere recto et parallelo, patella longiore quam latiore apicem versus attenuata, tibia multo breviore et latiore antice longe crinita, extus ad apicem apophysa articulo longiore, simplice, recta et acuta ad mar-

♂. Pedes-maxillares albo testacei, femore longo, gracili, vix arcuato, spinis longis nigris 8 seriem unicam formantibus infra instructo, patella gracili, fere duplo longiore quam latiore, haud convexa, tibia patella multo longiore, cylindrico recto, utrinque pilis nigris longis parce munita, tarso tibia fere longitudine æqua, angusto, paulo attenuato, haud convexo nec depresso, apice simplice pilis nigris erectis producto, bulbo globoso nitidissimo, laminis membranaceis binis minutis breve producto.

Algérie : Ravin de l'Oued-el-Kebir, près Blidah.

Nous avons trouvé cette espèce au mois de mai sous de très grosses pierres au bord du torrent.

Elle est remarquable par la série de longues épines dont le fémur de la patte-mâchoire est armé chez le mâle.

SELAMIA HISTRIONICA sp. nov.

♀ Long. 5 à 5^{mm}5.

Cephalothorax oblongus, convexus, nitidus, obscure fusco olivaceus, linea media dilutiore parum expressa notatus. Oculi fere ut in *S. reticulata* sed medii antici minores. Clypeus multo latior, area oculorum haud angustior, verticalis planus. — Abdomen late ovatum, convexum, supra nigro violaceum late testaceo variatum, maculis magnis valde irregularibus et digitatis biseriatim dispositis decoratum, infra cinereo testaceum haud vittatum. Mamillæ albo testaceæ. Sternum fusco rufescens nitidum. — Pedes sat longi et robusti obscure fulvo olivacei, patellis metatarsis tarsisque dilutioribus, tibia I et metatarsis I et II muticis, tibia II spinis duabus gracilibus et setiformibus infra instructa; pedes postici valde aculeati, tarsis gracilibus et longis utrinque 2 vel 3 breve aculeatis. Vulva fovea magna paulo latiore quam longiore, anguste marginata atque plagam magnam rufam obtuse cordiformem includente.

♂ Long. 4^{mm}3.

Pedes longiores fulvi, femoribus infuscatis. Pedes-maxillares fulvo olivacei, tibia tarsoque rufescentibus, femore fere recto et parallelo, patella longiore quam latiore apicem versus attenuata, tibia multo breviore et latiore antice longe crinita, extus ad apicem apophysa articulo longiore, simplice, recta et acuta ad mar-

ginem tarsi contigua, haud canaliculata nec lamellosa (ut in *S. reticulata)*; tarso maximo late ovato parum attenuato, obtusissimo; bulbo testaceo valde convexo.

Algérie : Oran, au Camp-des-Planteurs ! Daya (L. Bedel), Nemours ! Marnia ! Gorges de l'Isser !

---

ginem tarsi contigua, haud canaliculata nec lamellosa (ut in *S. reticulata)*; tarso maximo late ovato parum attenuato, obtusissimo; bulbo testaceo valde convexo.

Algérie : Oran, au Camp-des-Planteurs ! Daya (L. Bedel), Nemours ! Marnia ! Gorges de l'Isser !